

Anesthésie

Intubation

A la pose oui non

A la dépose oui non

Fibroscope avant la pose :

Normale

Gastrite

Œsophagite

Ulcère

Suites les jours suivants

Effets secondaires après la pose

Nausées	oui	non	durée
Vomissements	oui	non	durée
Déshydratation	oui	non	hospitalisation
Crampes abdominales :	oui	non	durée
Epigastralgies :	oui	non	durée
Brûlures rétro-sternales	oui	non	durée

Traitements prescrits

Complications mineures ne nécessitant pas le retrait du ballon

Constipation

Eructions nauséabondes

Ballonnements

Dégonflage du ballon avant 6 mois

Autres

Complications sévères entraînant le retrait du ballon et d'évolution favorable

Œsophagites de grade III ou IV

Ulcères gastriques

Obstruction gastrique

Ablation précoce du ballon pour intolérance

Pancréatite aigue

Complications sévères entraînant le retrait du ballon, entraînant des séquelles

Perforation gastrique

Migration du ballon avec occlusion intestinale

Rupture œsophagienne lors du retrait du ballon.

Incarcération œsophagienne

Inhalation lors de la pose ou de la dépose

mortalité

autres

Perte de poids (kg)

A la dépose

6 mois après la dépose

1 an après la dépose

IMC

A la dépose

6 mois après la dépose

1 an après la dépose

Suivi nutritionnel

Pendant la pose

< 1 fois /mois

>1 fois /mois

Après la dépose

< 1 fois/mois

➤ 1 fois/mois

Suivi psychiatrique

Exercice physique

Oui

Non

Autre stratégie

Perdu de vue

Pendant les 6 mois de la pose

Après la dépose (délai en mois après la dépose)