



Critères de Baveno VI :
c'est bien, mais il faut
avoir un FibroScan® ...

Nombre de gastroscopies évitées grâce aux critères de Baveno VI

COHORTE USA (n=161)

- Patients avec VO Grade II/III méconnues : **0/14**
- Sensibilité : 100 % [**77**-100]
- VPN : 100 % [**91**-100]

- Endoscopies évitées grâce aux critères de Baveno : **26 %**

COHORTE ITALIE (n=101)


- Patients avec VO Grade II/III méconnues : **0/17**
- Sensibilité : 100 % [**80**-100]
- VPN : 100 % [**79**-100]

- Endoscopies évitées grâce aux critères de Baveno : **16 %**

Recommandations de Baveno VI : Dépistage des varices oesophagiennes

Baveno V

**FOGD pour TOUS
les cirrhotiques**



Baveno VI

**Pas de FOGD si plaquettes > 150 000
ET FibroScan® < 20 kPa**

**Mesure plaquettes et FibroScan®
annuels**

**FOGD si baisse des plaquettes
ou augmentation du FibroScan®**

Critère « plaquette-MELD »

**Pas de FOGD si plaquettes > 150 000
ET MELD < 6**

**Environ 45 % de gastroscopies évitées
mais**

4 à 10 % de VO Grade II/III méconnues