## **SCORE DE CONSTIPATION (KESS)**

1. Depuis combien de temps êtes-vous constipé(e)?	Entre 0 & 18 mois	Entre 18 mois & 5 ans	Entre 5 & 10 ans	Entre 10 & 20 ans	Plus de 20ans
	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
Utilisez vous des médicaments laxatifs ?	Jamais	Rare / courte période	Fréquent / utilisation régulière	En continu mais inefficaces	
	(0)	(1)	(2)	(3)	
3. Allez vous à la selle (avec ou sans traitement) ?	Au moins 1 fois tous les 2 jours	2 fois par semaine ou moins	Moins d'une fois par semaine	Moins d'une fois toutes les 2 semaines	
	(0)	(1)	(2)	(3)	
4. Vous arrive-t-il d'avoir du mal à évacuer?	Jamais ou rarement	De temps en temps	Régulièrement	Toujours ou en s'aidant	
	(0)	(1)	(2)	(3)	
5. Avez vous l'impression d'évacuer incomplètement ?	Jamais	Rarement	De temps en temps	Fréquemment	Toujours
	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
6. Avez vous des douleurs de ventre ?	Jamais	Rarement	De temps en temps	Fréquemment	Toujours
	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
7. Avez vous des ballonnements de ventre ?	Jamais	Uniquement perçus par vous- même	Perçus par vos proches	Fréquemment	Toujours
	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
8. Faites vous des lavements, mettez vous des suppositoires ou aidez vous de vos doigts pour évacuer ?	Jamais	Lavements et suppositoires occasionnels	Lavements et suppositoires réguliers	Aide digitale occasionnelle	Aide digitale fréquente
	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
9. Combien de temps vous faut il en moyenne pour évacuer ?	Moins de 5 minutes	5 à 10 minutes	10 à 30 minutes	Plus de 30 minutes	
	(0)	(1)	(2)	(3)	
10. Avez vous des défécations difficiles et douloureuses?	Jamais	Rarement	De temps en temps	Fréquemment	Toujours
	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
11. La consistance de vos selles est elle ?	Normale ou molle	De temps en temps dure	Toujours dure	Dure comme des billes	
	(0)	(1)	(2)	(3)	
12. Vous arrive-t-il d'avoir besoin d'aller la selle et de ne pas pouvoir évacuer ?	Jamais	Rarement	De temps en temps	Toujours	
	(0)	(1)	(2)	(3)	

Le score de KESS comporte au total 12 items portant sur l'ancienneté de la constipation, l'utilisation de laxatifs ( $\pm$  suppositoire  $\pm$  lavements), la réalisation de manœuvres digitales, la fréquence des selles. Une constipation est retenue pour un score  $\geq$  10/39. Deux questions du score de KESS recherchent une éventuelle dyschésie associée.