



## **Hémorragie de l'HTP : y aller dans les 24 h**

*Krag A, Danemark, EASL 2019, Abs. PS-022 actualisé*

## Association entre le délai de réalisation de la FOGD et mortalité à 6 semaines

|  | Analyse univariée<br>OR (95% CI) | Analyse multivariée<br>OR (95% CI) | p    |
|--|----------------------------------|------------------------------------|------|
| <b>Délai de réalisation de la FOGD</b> |                                  |                                    |      |
| < 6 heures                             | Réf.                             | Réf.                               |      |
| 6-12 heures                            | 1,01 (0,66-1,54)                 | 1,08 (0,66-1,75)                   | 0,76 |
| 12-24 heures                           | 0,96 (0,51-1,79)                 | 0,92 (0,43-1,97)                   | 0,82 |
| > 24 heures                            | 2,19 (1,10-4,35)                 | 2,68 (1,16-6,19)                   | 0,02 |

- FOGD < 24 heures, OR (95% CI) : 0,38 (0,16-0,86); p=0,020
- Taux de mortalité à 6 semaines : 17,5 % (< 24 hrs) vs 31,7 % (≥ 24 hrs)
- FOGD < 6 ou 12 heures non associée à une diminution de la mortalité / FOGD < 24 hrs

## Association entre le délai de réalisation de la FOGD et mortalité à 6 semaines

|  | Analyse univariée<br>OR (95% CI) | Analyse multivariée<br>OR (95% CI) | p     |
|--|----------------------------------|------------------------------------|-------|
| <b>Délai de réalisation de la FOGD</b> |                                  |                                    |       |
| < 6 heures                             | Réf.                             | Réf.                               |       |
| 6-12 heures                            | 1,04 (0,56-1,93)                 | 1,05 (0,52-2,09)                   | 0,90  |
| 12-24 heures                           | 1,11 (0,47-2,63)                 | 1,34 (0,50-3,57)                   | 0,57  |
| > 24 heures                            | 13,8 (1,67-114)                  | 19,7 (2,03-191)                    | 0,010 |

- FOGD < 24 heures, OR (95% CI) : 0,053 (0,006-0,51); p=0,011
- Taux de mortalité à 6 semaines : 34,0 % (< 24 hrs) vs 87,5 % (≥ 24 hrs)
- FOGD < 6 ou 12 heures non associée à une diminution de la mortalité / FOGD < 24 hrs