



Vérifions le statut VHB avant de traiter le VHC

Jaroszewicz J, Pologne, EASL 2019, Abs. THU-217 actualisé

3 cas de réactivation virale VHB sous traitement par antiviraux directs

	Pt 1	Pt 2	Pt 3
Age	28	59	30
Sexe	M	M	M
Traitement AAD	OBV/PTV/r+DSV+RBV	LDV/SOF+RBV	OBV/PTV/r+DSV+RBV
Fibrose	4	4	3
HBsAg	Pos.	Pos.	Pos.
HBeAg	Nég.	Nég.	Nég.
ADN-VHB	25 IU/mL	Nég.	Nég.
Traitement antérieur	Non	Oui : LAM	Non
Temps de réactivation sous AAD	S5	S8	S12
Taux d'ADN-VHB à la réactivation (IU/mL)	7,6 log ₁₀	3,2 log ₁₀	1,3 log ₁₀
ALAT à la réactivation (IU/mL)	1 337	< limite de la normale	< limite de la normale
AAD / Analogues nucléotides	Arrêt ETV	Poursuite LAM	Sans traitement
Devenir VHB	ETV AND-VHB (-)	Résistance à LAM Switch vers TDF	Pas d'analogues nucléotidiques ADN-VHB (-)