



**Methotrexate :  
plus de peur que de mal**

# Facteurs associés à une élasticité $\geq 7,9$ kPa

Facteurs	OR	p	OR ajusté (95% CI)	p
Dose cumulée de MTX	0,96	0,06	0,99 (0,95-1,03)	0,68
Âge	1,003	0,63	1,02* (1,00-1,04)	0,04
Sexe (homme)	1,56*	0,01	1,62* (1,07-2,45)	0,02
Psoriasis	1,74**	0,003	1,51 (0,98-2,32)	0,06
IMC	1,13***	< 0,001	1,13*** (1,10-1,17)	< 0,001
Diabète	5,25***	< 0,001	3,19*** (1,95-5,20)	< 0,001
Hyperlipidémie	1,97***	< 0,001	1,23 (0,77-1,94)	0,375
Hypertension	2,33***	< 0,001	1,34 (0,87-2,06)	0,18
Alcool (> 14 unités/sem)	0,76	0,37	0,68 (0,33-1,32)	0,28

\*  $p < 0,05$  ; \*\*  $p < 0,01$  ; \*\*\*  $p < 0,001$

# Facteurs associés à une élasticité $\geq 7,9$ kPa

Facteurs	OR	p	OR ajusté (95% CI)	p
Dose cumulée de MTX	0,96	0,06	0,99 (0,95-1,03)	0,68
Âge	1,003	0,63	1,02* (1,00-1,04)	0,04
Sexe (homme)	1,56*	0,01	1,62* (1,07-2,45)	0,02
Psoriasis	1,74**	0,003	1,51 (0,98-2,32)	0,06
IMC	1,13***	< 0,001	1,13*** (1,10-1,17)	< 0,001
Diabète	5,25***	< 0,001	3,19*** (1,95-5,20)	< 0,001
Hyperlipidémie	1,97***	< 0,001	1,23 (0,77-1,94)	0,375
Hypertension	2,33***	< 0,001	1,34 (0,87-2,06)	0,18
Alcool (> 14 unités/sem)	0,76	0,37	0,68 (0,33-1,32)	0,28

\* p < 0,05 ; \*\* p < 0,01 ; \*\*\* p < 0,001